



ԳԵՏՆԱՄՈՒՇԿՆԵՐ
LYCOPODIOPHYTA
ПЛАУНЫ

320** *Lycopodium selago* L. — Գեղնամուշկ — Плаун баранец

CR B 1 ab(ii,iii,iv) + 2 ab(i,ii,iii,iv)



© ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Կարեգորիա: Կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է: Հայտնաբերվել է Մրխուզի լեռնաշղթայից 1982 թ.: Հայաստանի ֆլորայի համար հանդիսանում է ոչ միայն նոր տեսակ, այլև նոր ցեղի, նոր ընտանիքի և ընդհանրապես նոր կարգի պատկանող տեսակ: Տարածման և բնակարարյան շրջանների մակերեսը 10 քառ. կմ–ից պակաս է:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված չէր:
Ընդգրկված չէ CITES–ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:
Նկարագրություն: Բազմամյա, մշտադալար խոտաբույս է՝ 5–10 սմ բարձրությամբ: Յուղունները մի փոքր բարձրացող, ուղիղ: Տերևները գծալին–նշտարած, հեքթաղիք, պարարած, խիստ դասավորությամբ: Սպորանգիումները տերևների անոթներում, մեկական:

Տարածում: Հանդիպում է միայն Իջևանի ֆորիստիկական շրջանում (Մրխուզի լեռնաշղթա): AOO 8 քառ. կմ է, րկալիստաղ՝ 1: Համարյա կոսմոպոլիտ է՝ ամենուրեք տարածված բուսատեսակ:

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիտոցենոլոգիական առանձնահատկություններ: Աճում է միջինից մինչև ենթալպյան գոտի, ծ. մ. 1000–2300 մ բարձրությունների վրա, անասուններում, խոնավ ժայռերի վրա:

Սահմանափակող գործոններ: Սահմանափակ տարածման և բնակարարյան շրջաններ:

Պահպանության միջոցառումներ: Պահպանության գործողություններ չեն իրականացվում: Անհրաժեշտ է կազմակերպել հետազոտական աշխատանքներ՝ նոր աճելավայրեր հայտնաբերելու համար, իրականացնել պաշարյացիայի վիճակի մոնիթորինգ:

*** Category.** Critically endangered species. It was found in Mrkhuz mountain range in 1982. It was considered not only new species for the flora of Armenia, but also a species that belonged to new genera, new family and new order. The extent of occurrence (EOO) and the area of occupancy (AOO) are less than 10 km².

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Perennial evergreen herb 5–10 cm. Stems slightly ascending–erect or erect. Leaves spirally arranged, linear–lanceolate, dense. Sporangia solitary, axillary.

Distribution. It grows only in Idjevan floristic region (Mrkhuz mountain range). AOO is 8 km², locations are 2. It is almost cosmopolite — plant that occurs in most parts of the world.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. This species grows from middle up to sub–alpine belt, at the altitude of 1000–2300 meters above sea level, in the forests, in moist rocks.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: monitoring of the population state, search of new habitats.

*** Սկզբնաղբյուրներ/References**

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA
Тахтаджян А. Л. 1954. Сем. Lycopodiaceae. Флора Армении, 1: 8. Ереван.
Մուզմով՝ Կ. Գ. Թամանյան
Compiler K. G. Tamanyan

* Այստեղ և հետագայում անգլերեն տեքստերը և սկզբնաղբյուրները հաստատված չեն ՀՀ կառավարության որոշմամբ:

** Համարակարգումը տրվել է ըստ «Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքի հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2010 թ. N 72 որոշման: